

) FICHA TÉCNICA

"USO AGRÍCOLA"



spirodiclofen

INSECTICIDA-ACARICIDA SUSPENSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Spirodiclofen: 2,2-dimetilbutirato de 3-(2,4-diclorofenil)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-

en-4-ilo.

(Equivalente a 240 g/L a 20°C) 22.50

INGREDIENTES INERTES:

Anticongelante, Humectante/Dispersante, Regulador de pH, Preservante,

Antiespumante, Espesante y Medio dispersante 77.50

TOTAL 100.00

No. de Registro: RSCO-INAC-0103R-X0286-064-22.5



Tóxico si se inhala

"HECHO EN CHINA"





PELIGRO



Carr. Panamericana Km 284 2da. Fraccion de Crespo C.P.: 38110 | Celaya, Gto. 461 192 0600



) FICHA TÉCNICA

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS" "INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

ARAFORTE debe ser aplicado como tratamiento preventivo al inicio de las infestaciones de ácaros. Presenta largo efecto residual y notables efectos de protección.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (ML/HA)	OBSERVACIONES
Limonero Naranjo Toronjo Lima Mandarino Pomelo (7)	Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus)	400-600	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días al observar los primeros individuos. Volumen de aplicación 600-700 L de agua/ha.
Aguacate (2)	Ácaro café (Oligonychus punicae)	600-1000	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días iniciando cuando se presente los primeros individuos. Volumen de aplicación de 750-850 L de agua/ha.
Manzana (7)	Araña de dos manchas (Tetranychus urticae)	500-600	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga, período de protección 14 días después de la primera aplicación. Volumen de aplicación 700-800 L o agua/ha.
Arándano Frambuesa Fresa Zarzamora (7)	Araña roja (Tetranychus urticae)	400 - 600	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua /ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 2 horas después de la aplicación del producto

Carr. Panamericana Km 284 2da. Fraccion de Crespo C.P.: 38110 | Celaya, Gto. 461 192 0600



) FICHA TÉCNICA

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Calibre el equipo de aspersión para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme del cultivo. Llene el tanque de mezclado a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de **ARAFORTE.**

Complemente con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.

En aplicaciones con equipo terrestre se recomienda utilizar un volumen de aplicación de 600 litros de agua por hectárea. Durante el uso y manejo de este producto, utilice el equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, googles o lentes de seguridad para productos químicos, guantes y botas de neopreno, mascarilla con respirador y delantal industrial. Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Después de una jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia. Almacenar el equipo de protección, así como el producto en el lugar de trabajo.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar **ARAFORTE** cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 Km/h cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas de aspersión del producto. Si hay pronósticos de lluvias intensas aplique hasta después de que éstas hayan pasado. No aplicar en horas de excesivo calor.

INCOMPATIBILIDAD: El producto **ARAFORTE** no debe mezclarse con ningún otro plaguicida, fertilizante o químico en general.

FITOTOXICIDAD: ARAFORTE no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

"MANEJO DE RESISTENCIA"

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL."

Carr. Panamericana Km 284 2da. Fraccion de Crespo C.P.: 38110 | Celaya, Gto. 461 192 0600