



Decis[®] Forte

Insecticida / Concentrado emulsionable

GRUPO

3A

INSECTICIDA

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO**Ingrediente activo:**

Deltametrina

Composición porcentual:

Ingrediente Activo:	% en peso
Deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato	10.70
(Equivalente a 100 g. de i.a./L a 20°C)	
Ingredientes inertes:	
Solventes, anticongelante, surfactante, dispersante y coadyuvantes	89.30
TOTAL:	100.00

Categoría toxicológica:

3 Peligro

No. de Registro:

RSCO-INAC-0119-390-009-011

Descripción:

Decis[®] Forte es un insecticida piretroide que actúa por ingestión y contacto sobre el sistema nervioso de los insectos. Las aplicaciones consecutivas del producto pueden ocasionar problemas de resistencia de la plaga.

USOS

Cultivo	Plaga		Dosis ml/ha
	Nombre común	Nombre científico	
Sorgo** (1)	Gusano cogollero Mosquita de la panoja	<i>Spodoptera frugiperda</i> <i>Contarinia sorghicola</i>	125 – 150 40 – 60*
Maíz (1)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125 – 150
Jitomate (1)	Gusano del fruto Gusano soldado	<i>Helicoverpa (Heliothis) zea</i> <i>Spodoptera exigua</i>	200 – 250 200 – 225
Tomate de cáscara (1)	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	200 – 225
Papa (1)	Palomilla de la papa Gusano soldado	<i>Phthorimaea operculella</i> <i>Spodoptera exigua</i>	100 – 150 200 – 225
Chile (1)	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	200 – 225

Ficha técnica - Productos Fitosanitarios

Berenjena (1)	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	200 – 225
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía (3)	Barrenador del fruto	<i>Diaphania hyalinata</i>	150 – 250

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 horas.

() I. de S.: Intervalo de seguridad. Días que deben respetarse entra la última aplicación y la cosecha.

*Aplicar al observar las primeras moscas en las panojas, repetir en caso necesario a intervalos de 10 días.

**La aplicación deberá realizarse al cogollo.

Cultivo	Plagas		Dosis ml/ha	Observaciones
	Nombre común	Nombre científico		
Cebollín Cebolla Ajo (1)	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	250	Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros individuos.
Jitomate Tomate de cáscara Berenjena Chile (1)	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	0.3 – 0.4 ml/L de agua	Condiciones para la Agricultura Protegida: Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando observe la aparición de las primeras larvas.
Jitomate Tomate de cáscara Berenjena Chile (1)	Gusano falso medidor	<i>Trichoplusia ni</i>	0.2 – 0.3 ml/L de agua	
Calabaza Calabacita Chayote Melón Pepino Sandía (3)	Gusano barrenador	<i>Diaphania nitidalis</i>	0.2 – 0.3 ml/L de agua	Condiciones para la agricultura protegida: Aplicar al observar las primeras guías dañadas y repetir una segunda aplicación a un intervalo de 7 días.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 h

() I. de S. : días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

125 ml y 450 ml