Boletín Técnico:	REGISTRO		
	VERSIÓN	CLAVE	PÁGINAS
	B.1	S072-L1-P0-0012	3 de 3

Salt-Out®

Fertilizante Inorgánico - Líquido
Registro COFEPRIS RSCO 064/VII/15

Salt-Out® desplaza sales del suelo, por acción de masas. Enmienda de Calcio-Magnesio Líquida y Nitrógeno Amínico diseñada para contrarrestar los problemas de salinidad y sodicidad del suelo y agua de riego, desplazando sales y sodio por acción de masas fuera del sistema radicular. El Calcio y el Nitrógeno Amínico reemplazarán al Sodio en la arcilla. Cuando el Nitrógeno Amoniacal es convertido en Nitrato, suficiente cantidad de Calcio estará disponible para tomar la posición que ocupaba el NH4+. Incrementa la disponibilidad del agua y de los nutrientes bloqueados por el sodio y las sales tanto del suelo como del agua de riego, permitiendo un mayor aprovechamiento de los fertilizantes aplicados. Contrarresta inmediatamente la salinidad y sodicidad del suelo y del agua de riego. Incrementa la penetración del agua en el perfil del suelo. Permite plantas con un crecimiento activo y con un alto aprovechamiento del agua de riego y nutrientes.

Composición Garantizada	**% p/p**
Nitrógeno (N).....	5.0 %
Calcio (Ca).....	15.0 %
Magnesio (Mg).....	1.0 %

RECOMENDACIONES DE USO:

Salt-Out® es una fórmula de Calcio Líquido y Nitrógeno Amínico diseñada para contrarrestar los problemas de salinidad y sodicidad del suelo y del agua de riego. Provee Calcio para satisfacer las necesidades fisiológicas y para el fortalecimiento de los tejidos vegetales, aumenta la resistencia al ataque de plagas y enfermedades e incrementar los rendimientos, la calidad y la vida post cosecha de los frutos.

Ventajas:

- Contrarresta inmediatamente la salinidad y sodicidad del suelo y del agua de riego.
- Incrementa la disponibilidad del agua y de los nutrientes bloqueados por el sodio y las sales del suelo y del agua de riego.
- Completamente soluble en bajos volúmenes de agua.
- Refuerza las raíces contra la toxicidad de sodio, favoreciendo la sanidad de las hojas, tallos, flores y frutos de la planta.
- Promueve la emergencia uniforme de la semilla y el prendimiento vigoroso de plántulas.
- Incrementa la penetración del agua en el perfil del suelo
- Promueve la formación de la estructura del suelo favoreciendo el drenaje del agua.
- Fortalece la estructura de las células creando mayor resistencia a las enfermedades.
- Disminuye los desórdenes fisiológicos en los frutos y órganos a cosechar
- Reduce la caída de flores y el aborto de frutos.
- Aumenta los rendimientos y calidad de los frutos y productos a cosechar.
- Aumenta el periodo de producción de los cultivos.

Instrucciones de Uso:

REGISTRO			
Boletín Técnico:	VERSIÓN	CLAVE	PÁGINAS
	B.1	S072-L1-P0-0012	3 de 3

CULTIVO	DOSIS AL SUELO(L/Ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN
HORTALIZAS: Jitomate, Chile, Pimiento, Papa, Tomate de Cáscara, Berenjena, Col, Cebolla, Cebollín, Ajo, Frijol Ejotero, Coliflor, Brócoli, Col de Bruselas, Espárrago, Lechuga, Espinaca, Acelga, Perejil, Cilantro y Epazote. **CUCURBITÁCEAS:** Calabacita, Melón, Pepino, Sandía, Calabaza y Chayote. **LEGUMINOSAS:** Frijol, Garbanzo, Chícharo y Soya.	5.0 – 10.0	Iniciar aplicaciones cuando el cultivo tenga de 3 a 4 hojas verdaderas o 8 días después del trasplante. Repita las aplicaciones durante el ciclo del cultivo, especialmente en floración y fructificación a intervalos de 14 días.
GRAMÍNEAS: Maíz, Sorgo, Trigo, Cebada, Avena y Caña de Azúcar.	5.0 – 10.0	Se recomiendan 1 a 2 aplicaciones, 20 y 45 días después de siembra.
BERRIES: Fresa, Zarzamora, Frambuesa y Arándano.	4.0 - 8.0	Iniciar aplicaciones en desarrollo vegetativo con el 50% de las dosis a intervalos de 7 a 14 días. Es muy importante aplicar en etapa de pre-floración y en fructificación la dosis normal a intervalos de 14 días.
FRUTALES CADUCIFOLIOS: Manzana, Durazno, Peral, Ciruela, Vid y Nogal. **FRUTALES TROPICALES:** Aguacate, Naranja, Limón, Lima, Mandarina, Toronja, Mango, Papaya, Guayaba, Banano, Plátano Macho, Plátano Dominico, Café y Rambután.	10.0 - 15.0	Se recomienda iniciar aplicaciones en Postcosecha, después de la poda y durante la brotación, realizar de 1 a 2 aplicaciones a intervalos de 14 a 21 días. Es importante aplicar en la etapa de amarre y llenado de fruto, realizar de 2 a 3 aplicaciones a intervalos de 14 a 21 días.
FORRAJES: Alfalfa, Ebo o Veza, Zacate Raygrass y Zacate Taiwan.	4.0 - 8.0	Realizar 1 a 2 aplicaciones en etapa de desarrollo vegetativo, 15 a 20 días después de siembra o corte, a intervalos de 7 a 14 días.
ORNAMENTALES: Rosa, Clavel, Garbera, Crisantemo, Solidago, Aster y Polar.	2.0 - 4.0/ por Riego	Aplicar en inicio de desarrollo del brote, realizar de 3 a 4 aplicaciones a intervalos de 7 a 14 días hasta formación del botón floral.

Método para Preparar y Aplicar el Producto:

Salt-Out® es compatible con la mayoría de los fertilizantes y plaguicidas recomendados en los cultivos indicados en la etiqueta. Evite la mezcla con productos base fosfatos y sulfatos. Para mayor información comuníquese con el Departamento Técnico de Stoller®.

Orden de mezcla:

1. Agua **2. Salt Out ®** **3. Plaguicida**

Garantía: ***STOLLER MÉXICO, S.A. DE C.V.*** GARANTIZA QUE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL PRODUCTO CORRESPONDEN ÍNTEGRAMENTE A LAS EXPRESADAS EN LA ETIQUETA, LAS CUALES ESTÁN RESPALDADAS POR ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD, POR LO QUE MANIFESTAMOS QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA LOS FINES RECOMENDADOS, SIEMPRE Y CUANDO SE ADQUIERA EN SU ENVASE ORIGINAL Y QUE EL SELLO DE GARANTÍA SE ENCUENTRE INTACTO. DADO QUE EL MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MEZCLADO Y APLICACIÓN ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE ***STOLLER MÉXICO, S.A. DE C.V.***, LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS RESULTANTES DE ELLO, ASÍ COMO DE ACCIDENTES O DESVIACIONES DE USO POR LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN INDICADAS EN LA ETIQUETA.