

FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”




ECONIL 720

clorotalonil

SUSPENSIÓN ACUOSA

FUNGICIDA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo (Equivalente a 720 g de i.a./L a 20°C)	52.00
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente (agua), estabilizante, dispersante, humectante, anticongelante y antiespumante.	<u>48.00</u>
TOTAL	100.00

No. de Registro: RSCO-FUNG-0309-400-008-052



Nocivo si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

ECONIL 720, es un fungicida de acción por contacto formulado como suspensión acuosa, recomendado para la prevención y control de las enfermedades en el cultivo del plátano. Puede usarse en aspersión diluida o concentrada.

USO RECOMENDADO:

Cultivo	Enfermedad Nombre común/Nombre científico	Dosis L/ha
PLÁTANO (7)	Sigatoka amarilla: <i>Mycosphaerella musicola</i> Sigatoka negra: <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i>	1.5-2.5
() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS : 12 horas después de la aplicación		

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el envase antes de usar el producto. Para abrir el envase desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicarse debe ser diluido en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **ECONIL 720** y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante agitación mientras se aplica.

Empiece las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para la aparición y desarrollo de enfermedades. Se recomienda tanto el método de aplicación terrestre como aéreo. Resiste muy bien al lavado por riego o lluvia.

CONTRAINDICACIONES: No aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta. No aplique sobre áreas que hayan sido aplicadas con aceite agrícola dentro de los 7 días siguientes para evitar daños a las hojas.

INCOMPATIBILIDAD: **ECONIL 720** no es compatible con sustancias alcalinas. La mezcla con otros productos será exclusivamente con aquellos que tengan registro vigente y estén autorizados para el cultivo aquí indicado. Cuando se desconozca la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos.

No combine **ECONIL 720** en el tanque aspersor con otros plaguicidas tenso-activos o fertilizantes, a menos de que sus experiencias anteriores hayan demostrado que la combinación antes mencionada es físicamente compatible y no causa daño a las plantas bajo sus condiciones de uso.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

› FICHA TÉCNICA

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PRECAUCIÓN

