



Ficha técnica – Productos Fitosanitarios

Muralla Max[®] 300 OD

Comercializado también como Muralla Max OD300
Insecticida / Dispersión en aceite

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

Imidacloprid + Betacyflutrin

Composición porcentual:

Ingredientes activos:	% en peso
Imidacloprid: (E)1-(6-Cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina.....	19.60
(Equivalente a 210 g de i.a./L a 20°C)	
Betacyflutrin: 3-(2,2-dicloro-vinil)-2,2-dimetil-ciclopropano-ácido carboxílico ciano-(4-fluoro-3-fenoxi-fenil)-metil éster.....	8.40
(Equivalente a 90 g de i.a./L a 20°C)	
Ingredientes inertes: dispersantes, emulsificantes, surfactante, antiespumante, antioxidante, buffer, disolventes.....	72.00
TOTAL	100.00

Categoría toxicológica:

4 Precaución

No. de Registro:

RSCO-MEZC-1101F-301-409-028

USOS

Cultivo	Plaga	Dosis L/Ha	Observaciones
Chicharo Frijol Soya (7)	Conchuela <i>Epilachna varivestis</i>	0.20 – 0.25	Aplice al observar los primeros adultos. Utilizar suficiente agua para lograr una buena cobertura tanto en el haz como en el envés de las hojas.
Cebada Trigo Arroz Maíz Sorgo Avena Triticale (7)	Pulgón del follaje <i>Schizaphis graminum</i>	0.15 – 0.25	Aplicar al observar los primeros pulgones. Utilizar suficiente agua para lograr una buena cobertura.
Calabaza Calabacita Pepino Melón Sandía (3)	Pulgón <i>Aphis gossypii</i>	0.2 - 0.3	Aplice cuando se detecten los primeros pulgones. Utilizar suficiente agua para lograr una buena cobertura. Repetir en caso necesario a intervalo de 7 días.

Muralla Max[®] 300 OD

Página 1 de 3

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. En caso de exportación de los productos agrícolas tratados con este agroquímico, el usuario deberá cerciorarse sobre las reglamentaciones vigentes en el país de destino final en cuanto a: cultivos autorizados, LMR's (tolerancias), tiempos de espera y residuos. En caso de duda, consulte las publicaciones respectivas o al técnico de la región.

Ficha técnica – Productos Fitosanitarios

Chile Papa Tomate de cáscara Berenjena (7) Jitomate (0)	Pulgón <i>Myzus persicae</i>	0.20 – 0.30	Aplice cuando se detecten los primeros pulgones. Repetir en caso necesario a intervalo de 7 días. Utilizar la suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura.
	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	0.15 – 0.25	Aplice cuando se detecten las primeras larvas. Repetir en caso necesario a intervalo de 7 días. Utilizar la suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura.
Lima Limonero Mandarino Naranja Toronjo Tangerino (0)	Ninfas y Adultos de Psílido Asiático de los cítricos <i>Diaphorina citri</i>	40 – 50 ml / 100 L agua	Aplicar al observar los primeros adultos y ninfas en los brotes tiernos de la planta. Utilizar la suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura.
Vid (3)	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	0.3 – 0.4	Aplicar al observar los primeros adultos e inmaduros en los racimos en etapa de floración. Utilizar la suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada (intervalo: 12 días) cuando se utilice la dosis baja y una sola aplicación al utilizar la dosis alta.
Chile (7)	Picudo del chile <i>Anthonomus eugenii</i>	0.4 – 0.6	Realizar dos aplicaciones con un intervalo de 12 días.
Crisantemo (SL*)	Gusano soldado <i>Spodoptera</i> sp	0.15 – 0.25	Aplicar al observar los primeros insectos plaga. Repetir en caso necesario a intervalo de 8 días. Utilizar suficiente agua para lograr una buena cobertura.
	Mosquita blanca <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.15 – 0.20	
	Pulgón <i>Aphis</i> sp		
Algodonero (14)	Pulgón algodonero <i>Aphis gossypii</i>	0.2 – 0.3	Aplice cuando se detecten los primeros pulgones y chinches que atacan la bellota. Utilizar suficiente agua para lograr una buena cobertura.
	Chinche del algodonero <i>Pitecidea sayi</i>	0.25 – 0.3	
	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Chinche Lygus <i>Lygus</i> sp.	0.4 – 0.5	
Piña (30)	Sinfílicos <i>Scutigerella immaculata</i>	0.5 – 1.0	Aplicar al observar la presencia de sinfílicos en los primeros 20 cm del suelo cerca de la planta. La aplicación debe dirigirse al tercio inferior de la planta con suficiente agua para lograr una buena cobertura.
Caña de azúcar (45)	Adultos de salivazo <i>Aeneolamia postica</i>	0.25 – 0.30	Aplicar al observar los primeros adultos en el cogollo u hojas de las plantas. Utilizar la suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura.
Caña de azúcar (45)	Gallina ciega <i>Phyllophaga crinita</i> Termitas <i>Amitermes beaumonti</i>	0.3 – 1.0	Realizar una aplicación en banda al fondo del surco al momento de la siembra.

Ficha técnica – Productos Fitosanitarios

Arroz (7)	Chinche de la espiga del arroz <i>Oebalus insularis</i>	0.30 – 0.35	Aplicar al observar las primeras ninfas o adultos en la panícula de las plantas de arroz. Utilizar la suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura.
Lechuga (7)	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	0.3	Realizar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos.
Papaya (7)	Pulgón <i>Myzus persicae</i>	0.25 – 0.3	Realizar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos. Usar la dosis baja cuando haya baja población y usar la dosis alta cuando la población sea alta.
Brócoli Col Col de Bruselas Coliflor (7)	Pulgón cenizo <i>Brevicoryne brassicae</i>	0.2 – 0.3	Realizar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos.

El tiempo de reentrada a las zonas tratadas es de 12 horas.

() = I. de S.: días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

250 ml y 500 ml