

FICHA TÉCNICA



Información del Producto y de la Empresa

Nombre del producto: **VALTERRA +N**

Nombre común, Sinónimo: Ninguno conocido.

Usos materiales: Fertilizante.

Fabricante / fabricado para: VALTERRA FERTILIZER S. DE R.L DE C.V.

R.F.C.: VFE-210907-BA0

CALZADA GUSTAVO VILDOSOLA CASTRO NO. 4158 INT. 2

COL DIEZ DIVISIÓN DOS

C.P. 21620

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO.

info@valterra.mx

FERTILIZANTE – MACRO NUTRIENTE VEGETAL

Nitrógeno en alta concentración con tecnología. Es fundamental en proteína y clorofila, esencial también para la constitución de citoplasma y lípidos, altamente móvil en la planta y utilizado en los puntos de crecimiento.

ESPECIFICACIONES

Líquido

Nitrógeno (N) 42.00 %

420 grs/litro

(Amonio, Nitrato y UREA)

Densidad 1.3 gm / cm³

pH 7.5 – 8.5

PRECAUCIONES DURANTE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Usar equipo de protección de personal (lentes, guantes, overol, botas).
- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, embarazadas, en lactancia y animales.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No almacene en casa habitación.
- Los menores de 18 años no deben manejar el producto.

- Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.
- No se ingiera, inhale y evítese el contacto directo a los ojos.
- No mezcle o prepare el producto con las manos directamente.
- No destape la boquilla con la boca.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes, sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de aplicar. Además, sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

METODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Agítese antes de usar. Abra el envase girando cuidadosamente la tapa (no use la boca para abrir el envase). Mida con probeta graduada la dosis recomendada y diluya en agua. El mezclado o agitado se realiza por medio de la recirculación en el equipo de aplicación. Para mejor rendimiento deberá aplicarse evitando altas temperaturas y días de lluvia.

Calibrar su equipo antes de realizar la aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis	Intervalo de aplicación	Etapas de aplicación
Arándano, fresa, frambuesa, zarzamora, mora.	De 2 a 5 lts/ha	De 7 a 10 días	Durante todo el ciclo del cultivo, iniciando desde el trasplante.
Chile, Chile bell, tomato, tomatillo	De 2 a 4 lts/ha	Cada 2 semanas	Iniciar con aplicaciones después del trasplante hasta el final de la cosecha.
Cebolla, ajo, poro, cebollín.	De 2 a 5 lts/ha	De 7 a 10 días	Realizar las aplicaciones a partir de los 5 o 7 días de germinado el cultivo o realizado el trasplante; mantener las aplicaciones el resto del ciclo.
Espárrago	De 3 a 5 lts/ha	Semanal	Durante la etapa vegetativa del cultivo.
Brócolis, Col de bruselas, coliflor, rábano	De 3 a 5 lts/ha	De 7 a 15 días	Iniciar con aplicaciones una vez realizado el trasplante o a los 7 días de germinado el cultivo; continuar con la aplicación previa la última cosecha.
Pepino, melón, calabaza, calabacita, sandía	De 2 a 4 lts/ha	Cada 10 - 12 días.	Iniciar con aplicaciones una vez realizado el trasplante o a los 7 días de germinado el cultivo; continuar con la aplicación previa la última cosecha.
Lechuga, espinaca, apio, cilantro, perejil	De 2 a 4 lts/ha	De 7 a 15 días	Realizar aplicaciones una vez germinado el cultivo, hasta la cosecha.



VALTERRA

FERTILIZER S. DE R. L. DE C. V.

Alfalfa, lenteja, haba, garbanzo, ejote, frijol, chícharo, cacahuete, soya, alubia	De 3 a 5 lts/ha	Cada riego	Para forrajes aplicar a partir del primer riego de planta y continuar con los riegos después de los cortes
		De 7 a 15 días	Iniciar con las aplicaciones en el primer riego de planta
Maiz, sorgo, Avena, Centeno, arroz, cebada, trigo, ajonjolí, girassol, cártamo	De 3 a 5 lts/ha	De 7 a 15 días	Iniciar con las aplicaciones en el primer riego de auxilio hasta la cosecha.
Durazno, peral, manzano, tejocote, chabacano, almendro, ciruelo, membrillo, nogal, higo, aguacate	De 3 a 5 lts/ha	De 7 a 15 días	Realizar aplicaciones durante todo el ciclo del cultivo
Limón, naranja, toronja, mandarina, lima, tangerino	De 3 a 5 lts/ha	Cada 15 días	Realizar aplicaciones durante todo el ciclo del cultivo
Camote, papa, zanahoria	De 2 a 4 lts/ha	De 7 a 15 días	Iniciar aplicaciones una vez germinado el cultivo, continuar con las aplicaciones hasta la cosecha.
Palma de coco, datil y aceite.	De 3 a 5 lts/ha	De 7 a 15 días	Realizar aplicaciones periódicas durante todo el ciclo del cultivo.
Piña	De 3 a 5 lts/ha	Cada 15 días	Iniciar con las aplicaciones posterior al trasplante, continuar aplicando hasta la cosecha.
Algodón	De 3 a 5 lts/ha	Riegos de auxilio.	Iniciar con las aplicaciones en el primer riego de auxilio hasta la maduración del cultivo.
Papaya, plátano.	De 2 a 5 lts/ha	De 7 a 10 días	Iniciar con las aplicaciones una vez establecida la plántula y continuar hasta la cosecha.
Vid	De 3 a 5 lts/ha	De 7 a 15 días	Realizar aplicaciones durante toda la etapa vegetativa hasta iniciar la etapa de maduración del fruto.
Ornamentales y Viveros	De 2 a 4 lts/ha	De 7 a 15 días	Realizar aplicaciones durante todo el ciclo del cultivo

 Info@valterra.mx

 Aquitania #852 Montecarlo
CP 21255, Mexicali BC.

 686 212 2091



VALTERRA

FERTILIZER S. DE R. L. DE C. V.

GARANTIA

El fabricante garantiza que el contenido de este envase se encuentra conforme a las especificaciones de composición del producto. Sin embargo, ni el fabricante ni sus distribuidores se hacen responsables de los resultados que se obtengan por el manejo, dosificación y aplicación del producto, ya que son circunstancias que están fuera del control del fabricante y sus distribuidores.

EN CASO DE ALGUNA DUDA

CONSULTAR AL TÉCNICO DE MARCA Y/O DISTRIBUIDOR.



Info@valterra.mx



Aquitania #852 Montecarlo
CP 21255, Mexicali BC.



686 212 2091