



VALTERRA

MICROS

Fertilizante

Concentración balanceada de Oligoelementos quelatados, enriquecido para corregir carencias múltiples de micro elementos, especialmente para mejorar propiedades físicas, químicas y biológicas de los cultivos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Líquidos

Nitrógeno (N)	2.76%	Magnesio (Mg)	0.021%
Fósforo (P)	0.40%	Magnesio (mgO)	0.034%
Potasio (K)	0.80%	Hierro (Fe)	120ppm
Potasio (K2O)	0.96%	Cobre (Cu)	16ppm
Azufre (S)	0.08%	Manganeso (Mn)	10ppm
Calcio (Ca)	0.088%	Zinc (Zn)	5ppm
Calcio (CaO)	0.0123%	Adicionado con Vitaminas, Ac. Humicos, Ac. Fulvicos y Activadores	

Densidad 1.28 gr/cm³
pH 5.0

SOLUBLE 100%

Cont. 20 LTS

Fecha De Elaboracion:
Caducidad Dos Años Después De Su Elaboración.
Distribuido por: VALTERRA FERTILIZER S. DE R.L. DE C.V.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Precauciones durante el manejo y almacenamiento.

- Usar equipo de protección personal (lentes, guantes, overol, botas).
- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, embarazadas, lactancia y animales.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No almacene en casa habitación.
- Los menores de 18 años no deben manejar el producto.
- Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.
- No se ingiera, inhale y evítese el contacto directo a los ojos.
- No mezcle o prepare el producto con las manos directamente.
- No destape la boquilla con la boca.

En caso de presentar molestias por el contacto con el producto, lleve a la persona con el médico

En caso de ingestión accidental y si la persona está consciente, induzca el vómito y administre tomar dos vasos de agua. Si la persona se encuentra inconsciente, no provoque vómito, no trate de introducir nada por la boca y acuda inmediatamente al médico. Debe evitarse el contacto con la piel y ojos. En caso de existir contacto, lávese con abundante agua y jabón cada 15 min.

Medidas para protección al medio ambiente

- Respete las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases o empaques vacíos del producto en suelos, ríos, lagos, lagunas u otro cuerpo de agua.
- Respete las dosis y épocas de aplicación del producto

Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes, sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de aplicar. Además, sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

Garantía

El fabricante garantiza que el contenido de este envase se encuentra conforme a las especificaciones de composición del producto. Sin embargo, ni el fabricante ni sus distribuidores se hacen responsables de los resultados que se obtengan por el manejo, dosificación y aplicación del producto, ya que son circunstancias que están fuera del control del fabricante y sus distribuidores.

Método para preparar y aplicar el producto

Agítese antes de usar. Abra el envase girando cuidadosamente la tapa (no use la boca para abrir el envase). Mida con probeta graduada la dosis recomendada y diluya en agua. El mezclado o agitado se realiza por medio de la recirculación en el equipo de aplicación. Para mejor rendimiento deberá aplicarse evitando altas temperaturas y días de lluvia. Calibrar su equipo antes de realizar la aplicación

Recomendaciones de uso MICROS

Cultivo	Dosis	Intervalo de aplicación	Época de aplicación
Arándano, fresa, framboesa, cazaña, mora.	Foliar 1 a 2 L/Ha	10 a 15 Días	En prefloración y floración, posterior en cuajado y desarrollo del fruto, recomendando después de cada corte.
	Riego 2 a 4 L/Ha		
Chile, chile pelt, tomate, tomate.	Foliar 1 a 2 L/Ha	15 a 20 Días	Al inicio de la floración, repetir por intervalos durante la fructificación, hasta la cosecha.
	Riego 2 a 3 L/Ha		
Cebolla, ajo, pino, cebollín.	Foliar 1 a 2 L/Ha	10 a 15 Días	Después del trasplante o emergencia de la planta. Realizar aplicaciones periódicas hasta la cosecha.
	Riego 2 a 3 L/Ha		
Espárrago	Foliar 1 a 2 L/Ha	15 a 20 Días	Realizar aplicación una semana después de cada siembra. Durante la cosecha realizar aplicaciones periódicas.
	Riego 2 a 3 L/Ha		
Brocoli, corde brisetas, coliflor, rabano.	Foliar 1 a 2 L/Ha	10 a 15 Días	Después del trasplante o emergencia de la planta. Realizar aplicaciones periódicas hasta la cosecha.
	Riego 2 a 3 L/Ha		
Papino, melón, calabaza, calabacita, sandía.	Foliar 1 a 2 L/Ha	15 a 20 Días	Aplicar en prefloración, floración, anamo, llenado y continuar hasta la cosecha.
	Riego 2 a 3 L/Ha		
Lecuga, espinaca, ajo, cilantro, perejil.	Foliar 1 a 2 L/Ha	10 a 15 Días	Realizar aplicaciones a intervalos regulares durante todo el ciclo del cultivo hasta la cosecha.
	Riego 2 a 3 L/Ha		
Alfalfa, lenteja, haba, garbanzo, ejote, frijol, chícharo, cacahuate, soya.	Foliar 1 a 2 L/Ha	10 a 15 Días	Aplicar al inicio de la floración, repetir por intervalos durante la fructificación hasta la cosecha. Durante la cosecha continuar con aplicaciones periódicas.
	Riego 2 a 3 L/Ha		
Maíz, sorgo, amate, centeno, arroz, cebada, trigo, ajonjolí, girasol, cítricos.	Foliar 1 a 2 L/Ha	15 a 20 Días	Aplicar previo a la formación de espiga, continuar con aplicaciones periódicas durante el llenado del grano.
	Riego 2 a 4 L/Ha		
Durazno, peral, manzano, lapocle, chabacano, almendra, durazno, membrillo, nogal, higo, aguacate.	Foliar 2 a 3 L/Ha	10 a 15 Días	Aplicar posterior a la floración o caída de los pétalos fértiles. Continuar con aplicaciones periódicas durante el desarrollo del fruto hasta la cosecha.
	Riego 3 a 5 L/Ha		
Limon, naranja, toronja, mandarina, lima.	Foliar 2 a 3 L/Ha	15 a 20 Días	Iniciar en floración, duran anamo de flor y fructificación, hasta cosecha.
	Riego 3 a 5 L/Ha		
Cauli, papa, zanahoria.	Foliar 1 a 2 L/Ha	15 a 20 Días	Aplicar en prefloración, floración, anamo, llenado y continuar hasta la cosecha.
	Riego 2 a 3 L/Ha		
Palma de coco, dátil y aché.	Foliar 2 a 3 L/Ha	15 a 20 Días	Iniciar las aplicaciones con la presencia de la espiga, continuar con aplicaciones periódicas durante la formación del fruto.
	Riego 3 a 5 L/Ha		
Papa.	Foliar 1 a 2 L/Ha	10 a 15 Días	Desde la inducción floral, continuar con intervalos periódicos hasta la cosecha.
	Riego 2 a 3 L/Ha		
Algodón.	Foliar 1 a 2 L/Ha	25 a 30 Días	Previo a la primera floración, continuar durante la formación de las bolitas.
	Riego 2 a 3 L/Ha		
Papaya, plátano.	Foliar 2 a 3 L/Ha	10 a 15 Días	Aplicar posterior a la floración o caída de los pétalos fértiles. Continuar con aplicaciones periódicas durante el desarrollo del fruto hasta la cosecha.
	Riego 3 a 5 L/Ha		
Yd.	Foliar 2 a 3 L/Ha	15 a 20 Días	Previo a la floración y continuar con aplicaciones regulares hasta la cosecha.
	Riego 3 a 5 L/Ha		
Citróverdes y Viveros.	Foliar 1 a 2 L/Ha	10 a 15 Días	Aplicar periódicamente con los primeros brotes y durante la floración.
	Riego 2 a 3 L/Ha		

Consultar al técnico si tiene alguna duda.