



a Duwest company

cautivo

clotodime **120 CE**

RSCO-HEDE-0270-310-009-013

Formulación: Concentrado Emulsionable

Composición Porcentual

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Cletodime: (5RS)-2-[(E)-1-[(2E)-3-cloroaliloxiimino]propil]-5-[(2RS)-2 (etiltio)propil]-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona (Equivalente a 120 g i.a. /L a 20°C)	13.00
INGREDIENTES INERTES: Estabilizante, emulsificantes y solvente.	87.00
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Cautivo® 120 CE es un herbicida da base de cletodime de la familia ciclohexanodiona de acción sistémica selectiva. No afecta a hojas anchas. Su uso es en el control de malezas gramíneas anuales y perennes en post-emergencia. La mezcla del ingrediente activo y los surfactantes otorgan un rápido y prolongado control.

Modo de acción:

Cautivo® 120 CE Se absorbe rápidamente por las hojas de las gramíneas y luego es transportado por vía sistémica a las yemas donde ejerce su acción herbicida. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo. No presenta acción por vía radical. Los síntomas se aprecian de 1 a 3 semanas después de la aplicación dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. La maleza detiene su crecimiento a las 24 horas después de la aplicación.

Espectro de uso:

Su uso es en el control de malezas gramíneas anuales y perennes en post-emergencia presentes en cultivos como alfalfa, algodón, calabaza, calabacita, melón, sandía pepino, cebolla, tomate de cáscara, jitomate, papa, chile y berenjena.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx





a Duwest company

Malezas que se controlan con Cautivo® 120 CE:

Cultivo	Dosis L/Ha	MALEZAS Nombre común/Nombre científico	Observaciones
Forrajes de Alfalfa Forrajes de Trébol (15)	0.60-0.80		Aplicar en post- emergencia a la maleza y al cultivo, en aplicación total. Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo, con una altura máxima entre 15 - 20cm y/o 4 a 6 hojas como máximo.
Algodonero (60)	0.60-0.80		
Calabaza Calabacita Melón Sandía Pepino (14)	0.60-0.80		
Cebolla Ajo Poro Cebollín Espárrago (45)	0.60-0.80		
Tómate de cáscara (20) Jitomate Papa Chile Berenjena Okra Pimiento rojo (30)	0.60-0.80		
Agave (90)	1.5	Alpiste (<i>Phalaris minor</i>) Zacate Cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate Cola de Zorra (<i>Setaria parviflora</i>)	Aplicar en post-emergencia a la maleza temprana (cuando la maleza tenga de 5 a 15 cm) y al cultivo en aplicación total. Volumen total de 200 – 300 L de agua/ha.
<p>(I) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 48 horas después de la aplicación.</p>			

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
 Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.



a Duwest company

Recomendaciones de uso:

Use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, gafas, mascarilla, guantes y botas de neopreno que sólo se destine para el manejo y aplicación de plaguicidas. No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar el trabajo báñese y cámbiese de ropa. No deben manejar este producto personas menores de 18 años de edad o que no estén entrenadas para el manejo de plaguicidas.

Método de preparación:

Mézclase la dosis de **Cautivo® 120 CE** en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza. La superficie del suelo debe estar húmeda (lluvia o riego) para que el producto actúe adecuadamente, mezclar el producto con agua limpia y en cantidades suficientes para lograr buen cubrimiento. Se aplican de 150 a 250 L/ha de agua en mezcla con el producto, con los equipos convencionales de aspersión, usando una boquilla de abanico (Teejet 8002 y 8003). **Cautivo® 120 CE** se aplica en post-emergencia a la maleza y el cultivo, debe aplicarse solamente cuando las malezas tengan como máximo 15-20 cm de altura.

Contraindicaciones:

Por la actividad residual de **Cautivo® 120 CE** el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10 cm antes de sembrar o plantar cualquier otro cultivo de rotación. No aplicar el producto sin el equipo de protección adecuado.

Compatibilidad:

No mezclar a **Cautivo® 120 CE** con agroquímicos de fuerte reacción alcalina ni con productos que pudieran contener Permanganato de Potasio. Si se desconoce la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación. En caso de ser mezclado solo se podrá hacer con aquellos productos que cuenten con registro vigente ante la autoridad competente.

Fitotoxicidad:

Cautivo® 120 CE no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

Presentaciones: 950 mL.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

