

FICHA TECNICA



Información del Producto y de la Empresa

Nombre del producto: **VALTERRA +INDUCTOR**

Nombre común, Sinónimo: Ninguno conocido.

Usos materiales: Fertilizante.

Fabricante / fabricado para: VALTERRA FERTILIZER S. DE R.L DE C.V.

R.F.C.: VFE-210907-BA0

CALZADA GUSTAVO VILDOSOLA CASTRO NO. 4158 INT. 2

COL DIEZ DIVISIÓN DOS

C.P. 21620

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO.

info@valterra.mx

FERTILIZANTE – INDUCTOR DE RESISTENCIA

Por su gran acción sistemática una vez aplicado es absorbido desplazándose por el xilema y floema a todas las partes de la planta.

Es directamente fungitóxico y mejora el sistema inmunológico (inductor de resistencia) proporcionando la capacidad para combatir enfermedades.

ESPECIFICACIONES

Líquido

Potasio (K₂O) 28.60%

Fósforo P₂O₅ 33.00%

Densidad 1.55 gm/cm³

pH 7.0

Fosfonato de potasio 600 gr/litro

PRECACUCIONES DURANTE EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Usar equipo de protección de personal (lentes, guantes, overol, botas).
- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios o ropa.



Info@valterra.mx



Aquitania #852 Montecarlo
CP 21255, Mexicali BC.



686 212 2091

- Manténgase fuera del alcance de los niños, embarazadas, en lactancia y animales.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No almacene en casa habitación.
- Los menores de 18 años no deben manejar el producto.
- Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.
- No se ingiera, inhale y evítese el contacto directo a los ojos.
- No mezcle o prepare el producto con las manos directamente.
- No destape la boquilla con la boca.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes, sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de aplicar. Además, sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

METODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Agítese antes de usar. Abra el envase girando cuidadosamente la tapa (no use la boca para abrir el envase). Mida con probeta graduada la dosis recomendada y diluya en agua. El mezclado o agitado se realiza por medio de la recirculación en el equipo de aplicación. Para mejor rendimiento deberá aplicarse evitando altas temperaturas y días de lluvia.

Calibrar su equipo antes de realizar la aplicación

RECOMENDACIONES DE USO

Inductor de resistencia con efecto Fungicida – Bactericida.

Actúa de manera sistémica y de contacto; directo sobre hongos del grupo Oomycetes y algunos grupos de bacterias (pseudomonas, xanthomonas, erwinia).

Nos proporciona un efecto de Bio estimulación y tolerancia al estrés.

Es compatible con la mayoría de los productos agrícola, presenta antagonismo con productos de pH alcalino.

Cultivo	Dosis	Intervalo de Aplicación	Etapas de aplicación
Arándano, fresa, frambuesa, zarzamora, mora.	2 lts/ha	Cada 2 semanas	Aplicar iniciando la floración; continuar durante fructificación hasta una semana previa a la última cosecha.
Chile, chile bell, tomate, tomatillo	De 2 a 3 lts/ha	De 10 a 15 días	Iniciar con aplicaciones en floración hasta una semana previa a la última cosecha.
Cebolla, ajo, poro, cebollín.	De 2 a 3 lts/ha	De 2 a 3 semanas	Tratar a partir de los 45 días después de establecido el cultivo; mantener las aplicaciones el resto del ciclo.
Espárrago	3 lts/ha	Cada 2 semanas	Aplicar en desarrollo, brotes, descargas y cosecha.



VALTERRA

FERTILIZER S. DE R. L. DE C. V.

Brocoli, Col de bruselas, coliflor, rábano	3 lts/ha	De 7 a 15 días	Iniciar con aplicaciones a partir de 45 a 50 días; continuar hasta una semana previa a cosecha.
Pepino, melón, calabaza, calabacita, sandía	De 2 a 4 lts/ha	Cada 15 días	Iniciar con las aplicaciones una vez de inicio la floración; continuar con las aplicaciones durante la fructificación hasta una semana previa a la ultima cosecha.
Lechuga, espinaca, apio, cilantro, perejil	De 2 a 3 lts/ha	De 10 a 15 días	A partir de los 30 días de establecido el cultivo; continuar con las aplicaciones hasta la cosecha.
Alfalfa, lenteja, haba, garbanzo, ejote, frijol, chícharo, cacahuete, soya, alubia	De 2 a 4 lts/ha	Cada riego	Para forrajes aplicar en el riego posterior al primer corte y tratar en los riegos siguientes.
		Cada 2 semanas	Iniciar con las aplicaciones en floración; continuar durante la fructificación hasta una semana previa a la cosecha.
Maíz, sorgo, avena, centeno, arroz, cebada, trigo, ajonjolí, girasol, cártamo	De 3 a 5 lts/ha	De 2 a 3 semanas	Aplicar una vez que inicie la formación del grano; continuar con las aplicaciones hasta 15 días antes de la cosecha o trilla.
Durazno, peral, manzano, tejocote, chabacano, almendro, ciruelo, membrillo, nogal, higo, aguacate	De 3 a 5 lts/ha	De 2 a 3 semanas	Iniciar en la floración; continuar durante la fructificación hasta una semana previa a la ultima cosecha.
Limón, naranja, toronja, mandarina, lima.	De 3 a 5 lts/ha	Cada 15 días	Iniciar en la floración; continuar durante la fructificación hasta una semana previa a la ultima cosecha.
Camote, papa, zanahoria	De 2 a 4 lts/ha	De 7 a 15 días	Iniciar aplicaciones durante el proceso de formación y llenado del fruto; continuar con las aplicaciones hasta la cosecha.
Palma de coco, dátíl y aceite.	De 3 a 5 lts/ha	Cada 2 semanas	Aplicar durante el proceso de formación y llenado del fruto; continuar con las aplicaciones hasta la cosecha.
Piña	De 3 a 5 lts/ha	Cada 15 días	Iniciar a partir de la inducción floral; continuar durante todo el proceso de formación y llenado de fruto, hasta la cosecha.
Algodón	De 3 a 5 lts/ha	Riegos de auxilio.	En el segundo riego de auxilio, continuar las aplicaciones durante los riegos restantes en el ciclo.
Papaya, plátano.	De 2 a 4 lts/ha	De 10 a 15 días	Iniciar aplicaciones durante el proceso de formación y llenado del fruto; continuar con las aplicaciones hasta la cosecha.
Vid	De 3 a 5 lts/ha	De 7 a 15 días	Iniciar con las aplicaciones desde el inicio de formación de las vallas; continuar con



Info@valterra.mx



Aquitania #852 Montecarlo
CP 21255, Mexicali BC.



686 212 2091



VALTERRA

FERTILIZER S. DE R. L. DE C. V.

			las aplicaciones hasta una semana previa a la cosecha.
Ornamentales y Viveros	De 2 a 4 lts/ha	De 7 a 15 días	Hacer aplicaciones a partir de los 30 días de establecido el cultivo; continuar con las aplicaciones hasta la cosecha.

GARANTIA

El fabricante garantiza que el contenido de este envase se encuentra conforme a las especificaciones de composición del producto. Sin embargo, ni el fabricante ni sus distribuidores se hacen responsables de los resultados que se obtengan por el manejo, dosificación y aplicación del producto, ya que son circunstancias que están fuera del control del fabricante y sus distribuidores.

**EN CASO DE ALGUNA DUDA
CONSULTAR AL TECNICO DE MARCA Y/O DISTRIBUIDOR**



Info@valterra.mx



Aquitania #852 Montecarlo
CP 21255, Mexicali BC.



686 212 2091