



a Duwest company

Pentahcu

sulfato de cobre pentahidratado 65 SC

RSCO-FUNG-0336-X0162-064-21.36

Formulación: Suspensión concentrada

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Sulfato de cobre pentahidratado: sulfato de cobre pentahidratado. (Con un contenido de cobre metálico como elemento no menor a 25.4%) (Equivalente a 65.235 g de i.a./L a 20 °C)	21.36
INGREDIENTES INERTES: Complejante, solubilizante, tensoactivo, penetrante y disolvente.	78.64
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de Sulfato de cobre pentahidratado, el cual contiene 65.235 g de ingrediente activo por litro de producto.

Modo de acción:

Fungicida-bactericida de acción sistémica, de contacto y de amplio espectro. Previne y cura enfermedades. Es pasivamente absorbido por las esporas de los hongos y bacterias mientras crecen. Una vez absorbido, desactiva los sistemas enzimáticos de los organismos patógenos.

Espectro de uso:

Pentahcu® 65 SC se recomienda para enfermedades como roña, antracnosis, mildiú, pudriciones, manchas foliares, tizones, botrytis, y cenicillas en los cultivos de aguacatero, agave, cebolla, ajo, poro, cebollín, berenjena, chile, chile morrón, jitomate, papa, tomate verde, okra, gran variedad de ornamentales, cítricos y berries.



En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx





a Duwest company

Pentahcu® 65 SC está recomendado para el control de las siguientes enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro siguiente:

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (L/Ha)	OBSERVACIONES
	NOMBRE COMÚN/ NOMBRE CIENTÍFICO		
Aguacatero (SL)	Roña (<i>Sphaceloma perseae</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	2.0	Realizar 3 aplicaciones en aspersión directa al follaje y frutos a intervalo de 7 días. Volumen de aplicación 950 – 1050 L de agua/ha.
Agave (SL)	Pudrición blanda del cogollo del agave (<i>Pectobacterium carotovorum</i>)	1.0-2.0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten las condiciones favorables y se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Cebolla, Ajo, Poro, Cebollín (SL)	Mildiu de la cebolla (<i>Peronospora destructor</i>) Mancha foliar (<i>Alternaria porri</i>)	2.0	Realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días cuando se detecten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación 550 – 650 L de agua/ha
Berenjena, Chile, Chile morrón, Jitomate, Papa, Tomate verde, Okra (SL)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) Mancha bacteriana (<i>Xanthomonas vesicatoria</i>)	2.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 400 – 500 L de agua/ha
Azalea, Begonia, Clavel, Crisantemo, Dalia, Gardenia,	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Tizón (<i>Alternaria alternata</i>)	0.75 – 1.5	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad y se manifiesten los primeros síntomas; volumen

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

Geranio, Gerbera, Gladiola, Jacinto, Nochebuena, Rosa, Tulipán (SL)			de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Toronja, Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo, Cidro, Tangerino (SL)	Mancha grasienta (<i>Mycosphaerella citri</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	1.0 – 2.0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad y se manifiesten los primeros síntomas; volumen de aplicación sugerido 800 L de agua/ha
Zarzamora, Arándano, Grosella, Frambuesa, Fresa, Vid, Kiwi. (SL)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Cenicilla (<i>Sphaerotheca panosa</i>)	0.75 – 1.5	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad y se manifiesten los primeros síntomas; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha

(I) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

SL: Sin límite

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Lea cuidadosamente la etiqueta. Durante el manejo, preparación y aplicación de este producto use el equipo de protección señalado en el apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Pentahcu® 65 SC** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue (agua libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a _n de homogenizar la mezcla y aplicar de manera inmediata.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx





a Duwest company

Contraindicaciones:

Pentahcu® 65 SC no deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

Compatibilidad:

No se debe mezclar **Pentahcu® 65 SC** con otros productos agroquímicos.

Fitotoxicidad:

Pentahcu® 65 SC no es fitotóxico a la dosis recomendada y a los cultivos indicados.

Presentación:

950mL.

COPIA CONTROLADA

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

